

1. V bezvědomí je ten pacient,

**2. Nejčastější příčina zástavy oběhu u
dospělých je**

**3. Nejčastější příčina zástavy oběhu u
dětí je**

4. Příznaky zástavy oběhu jsou:

5. Lapavé nádechy jsou

6. Pokud vidíme lapavé nádechy,

7. Při resuscitaci musí být postižený

8. Nepřímá masáž srdce je

**10. Frekvence a hloubka nepřímé masáže
srdce je**

**9. Jak se provádí technika nepřímé
masáže srdce?**

11. Co je to AED?

12. Musíme provádět dýchání z plic do plic?

13. Pokud se poskytuje dýchání z plic do plic, měla by být resuscitace prováděna

14. Dýchání z plic do plic provádíme vždy

15. Vypuzovací manévr je:

**16. Při neúspěchu vypuzovacího manévru
musí být**

**17. Základním úkonem neodkladné
resuscitace je**

18. Zotavovací (stabilizovaná) poloha je

**19. Pod pojmem "Prvotní vyšetření" si
představujeme**

**20. Neodkladná resuscitace dětí se liší od
resuscitace dospělých tím, že**

21. Záchranka

22. Hasiči

23. Policie

**24. Jednotné evropské tísňové číslo v ČR
obsluhované hasiči**

**25. Povinnost poskytnutí první pomoc má
ze zákona**