

**který nereaguje na vnější podněty
(oslovení, bolest). ZR**

selhání srdce. A

náhlá porucha dýchání. NĚN

**postižený náhle zkolabuje, nereaguje na
žádné podněty, nedýchá nebo má lapavé
dechy. Ý**

**zpočátku jako normální nádechy, ale během pár desítek
vteřin se intervaly mezi nádechy prodlužují, postižený „lape po
dechu“, může pohybovat ústy „jako kapr“; nakonec veškerá
dechová aktivita odeznívá úplně. P**

**postupujeme tak, jako by šlo o
zástavu oběhu - zahájíme resuscitaci. RO**

**v poloze na zádech, s mírně zakloněnou
hlavou. NE**

**mačkání hrudníku směrem k podložce.
OD**

**Otočíme postiženého na záda a
stlačujeme hrudník uprostřed hrudní
kosti. K**

100 stlačení za minutu, 5 – 6 cm. LA

**Přístroj pro obnovení činnosti srdce
pomocí elektrického výboje. DN**

**Nemusíme, provádíme jen tehdy, pokud
to umíme a jsme ochotní je provádět.
OU**

střídáním 30 stlačení : 2 vdechům. RE

u tonoucích a u dětí. SU

**„Herda“ do zad, Heimlichův
manévr. SCI**

**okamžitě zahájena neodkladná
resuscitace. TA**

**správně prováděná nepřímá masáž srdce.
CI**

**poloha na boku s hlavou otočenou
k podložce. S**

**rychlé orientační zhodnocení stavu základních životních funkcí
(A-B-C neboli ověření volnosti dýchacích cest, zhodnocení stavu
dýchání a stavu oběhu). E**

**je potřeba provést vypuzovací manévr a
provádět dýchání z plic do plic. NA**

155 CHÁZ

150 Í

158 VE

112 ŠK

každý člověk. OLE